


ETZ - Penicilline challenge op de afdeling
Versie: 2, Gepubliceerd

	ETZ Ziekenhuis	
	Titel	ETZ - Penicilline challenge op de afdeling
	Versie	2

Document ID:	029235
Publicatiedatum:	11-04-2023
Te controleren voor:	10-11-2024
Auteur:	<ul style="list-style-type: none">• Leenders, Tessa• Adams, Aniek
Beoordelaars:	<ul style="list-style-type: none">• Leenders, Tessa• Berrevoets, Marvin• Eskens - van Zeeland, Lilianne
Autorisator:	Berrevoets, Marvin
Samenvatting:	Beschrijving van klinische challenge op penicillines bij pt met een geregistreerde penicilline allergie die een laag of matig risico op een allergische reactie hebben.

Wijziging tov vorige versie:toevoeging dat het gaat om patienten met een laag of medium risico op een allergische reactie op penicillines.

ETZ - Penicilline challenge op de afdeling

Versie: 2, Gepubliceerd

Doel

Blootstellen van patiënten, met een geregistreeerde allergie voor penicillines met een laag of medium risico, aan penicillines zodat bij een negatieve challenge delabeling kan plaatsvinden.

Uitvoerder/op afdeling/locatie

ETZ

Indicaties

Patiënten met een geregistreeerde penicilline allergie die via het stroomschema voldoen aan de criteria om een orale challenge uit te voeren, zodat achterhaald kan worden of het penicilline allergie label terecht is.

Het stroomschema is benoemd in het protocol: [ETZ - Allergie penicilline registratie en delabeling](#).

Contra-indicaties

- Gebruik anti-histaminica
- Zwangerschap

Complicaties

- Allergische (systeem) reactie (zeer lage kans)
- Effecten van medicatie om allergische reactie te behandelen (sufheid bij clemastatine (Tavegil))
- Hyperventilatie
- Vasovagale reactie

Werkwijze

Op drie tijdstippen wordt de patiënt blootgesteld aan een orale dosering penicilline. De eerste dosering betreft 1/10 van de gebruikelijke dosering. Tijdens de orale challenge worden de vitale functies gecontroleerd.

Benodigheden:

- Bloeddrukmeter
- Saturatiemeter
- Noodmedicatie (clemastine=Tavegil). Is aanwezig in de crashkar.
- Crashkar aanwezig op de afdeling.
- De zaalarts is op de hoogte van de challenge

Vooraf: patiënt moet gezien zijn door een lid van het A-team of allergoloog (vaststellen van de indicatie, uitsluiten contra-indicatie, ontwerp van protocol van test/behandeling voor patiënt). Patiënt ontvangt schriftelijke informatie over de test/behandeling en instructies ten aanzien van de medicatie.

Afspraken en verantwoordelijkheden:

Informed consent wordt door een lid van het A-team of de hoofdbehandelaar verkregen en vastgelegd in OnsEPD. De hoofdbehandelaar wordt te allen tijde ingelicht over de challenge. De challenge vindt plaats op de afdeling waar een zaalarts of PA/verpl specialist bereikbaar is die bekend is met het protocol voor het opvangen van (ernstige) allergische reacties.

Indien er inhoudelijk vragen zijn over de challenge kan er binnen kantooruren contact opgenomen worden met het A-team op 12335.

Voor challenge	Het A-team schrijft orale penicilline voor, afhankelijk van de eerdere allergie kan gekozen worden voor -Amoxicilline (bij penicilline allergie algemeen)
-----------------------	--

Geprint: 22-06-2023 13:15

ETZ - Penicilline challenge op de afdeling

Versie: 2, Gepubliceerd

	-Flucloxacilline -Amoxicilline/clavulaanzuur Daarnaast: clemastine 2mg zo nodig iv	
Tijdstip	Handelingen verpleegkundige op afdeling	
	Controleer of de noodmedicatie aanwezig is op de afdeling (aanwezig in crashkar).	
	Bij klachten/verschijnselen van een allergische reactie: ◦Onderbreek test/behandeling ◦Meet bloeddruk en pols ◦Neem contact op met behandelend arts/PA/vpl specialist	
t=0	Meten vitale gegevens (RR, pols, SaO ₂)	
t=0	Eerste gift antibiotica oraal in drankvorm	Amoxicilline: 50mg Flucloxacilline: 50mg Amoxicilline/clavulaanzuur: 62,5mg
t=30	Controle RR, pols, SaO ₂ , klachten patiënt Observeer de patiënt/vraag hoe het gaat.	
t=60	Tweede challenge in drankvorm na 1 uur indien er geen klachten zijn opgetreden	Amoxicilline: 500mg Flucloxacilline: 500mg Amoxicilline/clavulaanzuur: 625mg
t=60	Controle RR, pols, SaO ₂ , klachten patiënt Observeer de patiënt/vraag hoe het gaat.	
t=90	Controle RR, pols, SaO ₂ , klachten patiënt Observeer de patiënt/vraag hoe het gaat.	
t=120	Derde challenge in drankvorm na 2 uur indien er geen klachten zijn opgetreden	Amoxicilline: 500mg Flucloxacilline: 500mg Amoxicilline/clavulaanzuur: 625mg
t=120	Controle RR, pols, SaO ₂ , klachten patiënt Observeer de patiënt/vraag hoe het gaat.	
t=180	Afronden challenge, documentatie in EPIC. Vermeld klachten/verschijnselen tijdens de challenge zorgvuldig in EPIC - met tijdstip van optreden - Toegedijnde medicatie (hoeveelheid, concentratie, toedieningsvorm en tijdstip)	

Symptomen

Klachten die kunnen voorkomen bij een allergische reactie zijn:

- Plotseling jeuk in de handpalmen
- Roodheid en jeuk over het lichaam
- Doemgevoel (patiënt heeft het gevoel dat er iets ergs gaat gebeuren)
- Duizeligheid, misselijkheid
- Niet goed meer kunnen zien
- Bonzen van het hart
- Braken
- Diarree of aandrang
- Kortademigheid

Verschijnselen van een allergische reactie zijn:

- Netelroos (rode jeukende bulten)
- Angio oedeem (zwellen van slijmvliezen: dik ooglid of wang of dikke tong met daarbij ademhalingsproblemen)
- Rhinitis (loopneus, niezen, verstopte neus, jeukende neus)
- Conjunctivitis (rode, jeukende ogen, zwelling van oogleden)
- Astma (kortademigheid, piepen op de borst, hoesten)
- Shock (bloeddrukdaling, snelle pols, bewustzijnsverlies)

Geprint: 22-06-2023 13:15